

PAPÉIS AVULSOS
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

ALGUMAS NOTAS SÔBRE A FAUNA DE
LEPIDÓPTEROS DE MONTE ALEGRE

p o r

R. FERREIRA D'ALMEIDA

Esta é a primeira lista que publicamos sôbre as espécies de lepidópteros capturados no Distrito de Monte Alegre no Município de Amparo, Estado de São Paulo, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 1942. Foram ao todo três as excursões ali realizadas para a captura de insetos, sendo que o autor destas linhas fez parte apenas das duas primeiras efetuadas em setembro e outubro.

O Distrito de Monte Alegre compõe-se atualmente de terras cultivadas, predominando nelas a cultura do cafeeiro. As florestas que outrora embelezavam vales e serras de há muito desapareceram daquela região quase totalmente, determinando com isso o extermínio ou o afugentamento dos animais que ali então viviam e que deviam ser bem interessantes sob diversos pontos de vista. Hoje vemos ainda, de longe em longe, pequenos capões de mato situados principalmente nas fazendas N. S. da Encarnação, Bom Jesus e Santa Izabel. Na fazenda Santa Maria, já nos limites do Município de Serra Negra, pudemos observar mesmo um pequeno trecho de mata frondosa, talvez a melhor de toda a região, vestígios das antigas florestas e índice da exuberância da terra.

Com uma flora pouco diferenciada, de onde desapareceram numerosas essências florestais, inútil é dizer que a fauna é pobre, o que aliás é fácil inferir pelas espécies abaixo citadas.

Devemos declarar que na presente lista não estão computadas as espécies das famílias *Ctenuchidae* (= *Euchromitidae*) e *Arctiidae*, subfamília *Pericopinae*, as quais serão estudadas pelo nosso colega e amigo TRAYASSOS FILHO.

RHOPALOCERA

Fam. *PAPILIONIDAE**Battus bunichus* (Huebner)

Comum em setembro e outubro. Lagartas vivendo sobre as folhas das *Aristolochia*.

Battus polydamas (Linné)

Comum. Lagartas sobre *Aristolochia*.

Papilio thoas brasiliensis R. & J.

Comum. Lagartas sobre *Citrus*, sobre diversas *Piperaceae* e *Rutaceae*.

Papilio anchisiades capys Huebner

Comum. Lagartas sobre *Citrus*.

Papilio lycophron Huebner

Um pouco mais raro do que os anteriores. Lagartas sobre *Citrus*.

Fam. *PIERIDIDAE**Ascia monuste* (Linné)

Abundante em certas épocas do ano. Lagartas vivendo em grande número sobre as folhas da couve (*Brassica oleracea*), do nabo (*Brassica napus*), da nabica (*Raphanus raphanistrum*), bem assim sobre diversas *Cassia* (Leguminosa) e *Capparidaceae*.

Synchlœ maenacte (Boisd.) (*itaiayae* (Foett.)).

Um único exemplar capturado.

Eurema deva (Doubleday)

Comum. Lagartas sobre *Cassia*.

Eurema albula (Cramer)

Lagartas também sobre *Cassia*.

Phoebis sennae (Linné)

Muito comum. Lagartas sobre *Cassia*.

Phoebis neocypris (Huebner)

Bem mais rara do que a precedente. Lagartas sôbre diversas leguminosas.

Dismorphia psamathe (Fabr.)

Um ♂ capturado. Lagartas sôbre *Mimosaceae*.

Fam. *DANAIDAE*

Diogas erippus (Cramer)

Comum. Lagartas sôbre *Asclepias curassavica*.

Anosia gilippus (Cramer)

Comum. Lagartas vivendo igualmente sôbre a *Asclepias curassavica*.

Fam. *SATYRIDAE*

Euptychia hermes (Fabr.)

Muito comum. Lagartas sôbre diversas *Gramineaceae*.

Fam. *BRASSOLIDAE*

Caligo eurylochus brasiliensis (Felder)

Comum. Lagartas sôbre as fôlhas de diversas *Musaceae*.

Fam. *MORPHOIDAE*

Morpho achillaena paulista Fruhst.

Muito comum em tôda a região.

Fam. *HELICONIIDAE*

Dione vanillae (Linné)

Muito comum. Lagartas sôbre *Passifloraceae*.

Fam. *NYMPHALIDAE*

Anartia jatrophae (Johanss.)

Comum nos lugares descobertos. Lagartas sôbre *Verbena triphylla*.

Anartia amathea roeselia Eschsch.

Menos comum do que a precedente. Lagartas sobre *Acanthaceae*.

Precis lavinia (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Bouchea laetevirens* (*Verbenaceae*).

Euptoieta hegesia (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Turneraceae*.

Phyciodes lansdorfi (Godart)

Comum. Lagartas sobre *Justicia violacea* e *Schaneria lachnostachya* (*Acanthaceae*).

Vanessa virginiensis brasiliensis Moore

Muito comum.

Vanessa myrinna Doubeday

Pouco comum.

Hypna clytemnestra huebneri Butler

Comum. Lagartas sobre diversos *Croton* (*Euphorbiaceae*).

Doxocopa laurentia Godart

Pouco freqüente.

Ageronia epinome Felder

Comum. Lagartas sobre *Dalechampia triphylla* (*Euphorbiaceae*).

Prepona chalciope domna Fruhst.

Não é rara. Fácil capturá-la com isca de frutas fermentadas. Lagartas sobre *Lauraceae*.

Anaea appias Huebner

Comum.



Fam. *RIODINIDAE*

Anatole glaphyra Westwood

Três exemplares capturados.

Fam. *LYCAENIDAE*

Leptotes cassius (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Indigofera anil* (*Papilionaceae*) e *Plumbago capensis*.

Fam. *HESPERIIDAE*

Mimoniades versicolor (Latreille)

Comum.

Phocides palemon (Cramer)

Comum.

Proteides exadeus (Cramer)

Comum.

Achlyodes busirus (Cramer)

Comum. Lagartas sobre *Citrus*.

Pyrgus orcus (Cramer)

Muito frequente.

HETEROCERA

Fam. *ARCTIIDAE*

Phaegoptera depicta H. Schaeffer

Um exemplar capturado.

Phaegoptera histrionica H. Schaeffer

Um exemplar capturado.

Fam. *SPHINGIDAE*

Phlegethontius rustica (Fabr.)

Comum. Lagartas sobre *Verbenaceae*.



Phlegethontius sexta paphus (Cramer)

Comum. Lagartas vivendo sobre as fôlhas de *Nicotiana tabacum* (fumo), de *Solanum lycopersicum* (tomateiro) e de diversas espécies de *Capsicum*.

Protambulyx strigilis (Linné)

Comum. Lagartas sobre o cajá-manga (*Spondias dulcis*), cajá-mirim (*Spondias lutea*) *Anacardiaceae*.

Erinnyis ello (Linné)

Muito abundante. Lagartas sobre diversas plantas, sobretudo o *Manihot utilisima*.

Erinnyis obscura (Fabr.)

Comum.

Pholus anchemolus (Cramer)

Comum.

Xylophanes tersa (Linné)

Comum. Lagartas sobre *Rubiaceae*.

Fam. SATURNIIDAE

Rothschildia arethusa (Walker)

Comum. Lagartas polifagas.

Copaxa canella Walker

Comum. Lagartas sobre *Lauraceae*.

Fam. HEMILEUCIDAE

Automeris memusae Walker

Comum. Lagartas polifagas.

Automeris aurantiaca Weymer

Muito frequente. Lagartas polifagas.

Fam. ADELOCEPHALIDAE

Eacles magnifica Walker

Comum. Lagartas polifagas.

Fam. *PSYCHIDAE*

Oiketicus kirbyi Guild.

Comum. Lagartas polítagas.

Fam. *PHALAEENIDAE* (= *Noctuidae* Auct.)

Thysania zenobia (Cramer)

Um ♂ capturado.

Erebus odora (Linné)

Uma ♀ capturada.

Fam. *PYRALIDAE*

Myelobia smerintha (Huebner)

Muito abundante. As lagartas vivem no interior dos taquaruçus.